

Potilasinfo

Evorel® Conti

(depotlaastarit estradioli/noretisteroni)

Evorel Conti depotlaastarit (estradioli/noretisteroni)

Mitä ovat Evorel Conti depotlaastarit ja miksi ne on määrätty sinulle?

Evorel Conti on hormonikorvaushoitovalmiste. Se sisältää kahta naishormonia, estrogeenia ja progestiinia. Evorel Contia käytetään vaihdevuodet ohittaneille naisille, joiden viimeisistä luonnollisista kuukautisista on kulunut vähintään 6 kuukautta. Evorel Contia käytetään vaihdevuosien jälkeen esiintyvien oireiden lievittämiseen. Sinulle määrätään Evorel Contia vain, jos oireet häiritsevät huomattavasti päivittäistä elämääsi.

Kuinka Evorel Conti depotlaastarit vaikuttaa?

Naisen elimistössä muodostuvan estrogeenin määrä vähenee vaihdevuosien aikana. Tästä voi aiheutua oireina esim. kasvojen, kaulan ja rinnan kuumotusta (kuumia aaltoja). Evorel Conti lievittää näitä vaihdevuosien jälkeen esiintyviä oireita.

Mitä sinun pitää tietää ennen kuin aloitat Evorel Conti depotlaastarin käytön?

Hormonikorvaushoitoon liittyy riskejä, jotka on otettava huomioon, kun päätetään hoidon aloittamisesta tai jatkamisesta. Hoitokokemusta naisista, joilla on ennenaikaiset vaihdevuodet (munasarjojen toimintahäiriön tai leikkauksen vuoksi), on vähän. Jos sinulla on ennenaikaiset vaihdevuodet, hormonikorvaushoidon riskit voivat olla toisenlaiset. Keskustele asiasta lääkärin kanssa.

Sinun on käytävä Evorel Conti -hoidon aloittamisen jälkeen lääkärintarkastuksessa säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa). Keskustele lääkärin kanssa näiden käyntien yhteydessä Evorel Conti -hoidon jatkamisen hyödyistä ja riskeistä. Käy rintojen seulontatutkimuksissa säännöllisesti lääkärin suosituksen mukaisesti.

Älä käytä Evorel Contia jos jokin seuraavista koskee sinua. Jos et ole varma jostakin seuraavassa esitetystä kohdasta, käänny lääkärin puoleen ennen Evorel Contin käyttämistä.

- jos sinulla on tai on joskus ollut rintasyöpä tai jos sinulla epäillään sitä
- jos sinulla on estrogeeneille herkkä syöpä, kuten kohdun limakalvon (endometriumin) syöpä tai jos sinulla epäillään sitä
- jos sinulla on verenvuotoa emättimestä eikä sen syytä ole selvitetty
- jos sinulla on kohdun limakalvon liikakasvua (endometriumin hyperplasia), jota ei hoideta
- jos sinulla on tai on joskus ollut laskimotukos (tromboosi) esim. jalassa (syvä laskimotukos) tai keuhkoissa (keuhkoembolia)
- jos sinulla on veren hyytymishäiriö (kuten proteiini C:n, proteiini S:n tai antitrombiinin puutos)
- jos sinulla on tai on äskettäin ollut valtimotukoksesta aiheutuva sairaus, kuten sydäninfarkti, aivohalvaus tai rasisurintakipua (angina pectoris)
- jos sinulla on tai on joskus ollut maksasairaus ja maksan toimintakokeet eivät ole normalisoituneet
- jos sinulla on porfyriaksi kutsuttu harvinainen veren häiriö, joka esiintyy suvuittain (perinnöllinen sairaus)
- jos olet allerginen estradiolille tai noretisteronille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos olet raskaana tai imetät.

Jos jokin edellä mainituista sairauksista ilmaantuu ensimmäistä kertaa Evorel Conti -hoidon aikana, lopeta Evorel Contin käyttö ja käänny heti lääkärin puoleen.

Miten Evorel Conti depotlaastarit käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus: Evorel Contia käytetään tauottomana (jatkuvana) hoitona. Laastari kiinnitetään ihoon ja vaihdetaan kaksi kertaa viikossa. Laastarista vapautuu estrogeenia ja keltarauhashormonia 3–4 päivän ajan, minkä jälkeen laastari vaihdetaan. Suurimmalle osalle naisista ei tule säännöllistä, kuukausittaista emätinverenvuotoa Evorel Conti -hoidon aikana. Hoidon alussa saattaa kuitenkin esiintyä vuotoa tai tiputteluvuotoa, joka tavallisesti lakkaa muutaman kuukauden kuluessa. Lääkäri pyrkii määräämään pienimmän oireisiisi tehoavan annoksen mahdollisimman lyhyeksi aikaa. Keskustele lääkärin kanssa, jos vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko.

Käyttöohje:

Kiinnitä laastari puhtaalle ja kuivalle iholle vartalon vyötärön alapuolelle. Ihovoiteet, suihkusaippua, öljyt, linimentti ja talkki voivat heikentää laastarin kiinnittävyyttä.


Laastaria ei saa kiinnittää rintoihin eikä niiden lähelle. Laastarin kiinnityskohtaa on vaihdeltava siten, että samaan kohtaan saa kiinnittää uuden laastarin aikaisintaan viikon kuluttua.

Laastaria ei saa kiinnittää rikkoontuneelle tai ärtyneelle iholle. Älä kiinnitä laastaria vyötärölle, koska se voi siinä altistua vaatteiden hankaukselle.

Laastaria ei irroteta kylvyn ja suihkun ajaksi. Jos laastari irtoaa, sen tilalle vaihdetaan heti uusi laastari. Laastarin vaihtopäivä pidetään kuitenkin ennallaan. Kiinnitä laastari uimapuvun alle, kun otat aurinkoa.

1

Poista ensin toinen puolisko suojakalvosta.




2

Levitä laastarin paljas puoli iholle laastarin reunasta keskustaa kohti. Varo rypistämästä laastaria.

Poista suojakalvon toinen puolisko ja kiinnitä nyt paljastettu puoli rypistämättä laastaria.

Paina laastaria ihoa vasten kämmenellä noin 30 sekuntia. Älä koske laastarin liimapintaa sormillasi.



Laastari poistetaan irrottamalla ensin yksi kulma ja vetämällä sitten koko laastari varovasti irti. Laastarista iholle mahdollisesti jäävän liiman voi poistaa sormin hankaamalla tai pesemällä sen pois vedellä ja saippualla, öljyllä tai rasvaisella perusvoiteella.

Suihku, kylpeminen ja liikunta: Tavanomaisten toimintojen, kuten kylpemisen, suihkussa käynnin ja liikunnan aikana, laastari voi olla paikoillaan. Tarkista näiden toimintojen jälkeen, ettei laastari ole irronnut. Laastari suositellaan poistettavaksi saunomisen ajaksi ja vaihtopäivä kannattaa ajoittaa saunapäiväksi.

Jos unohdat kiinnittää Evorel Conti depotlaastarin

Kiinnitä uusi laastari mahdollisimman pian. Laastarinvaihtopäivä säilyy kuitenkin ennallaan. Älä kiinnitä kahta laastaria samanaikaisesti puuttuvaa lääkeannosta korvataksesi. Laastarin unohtuminen saattaa lisätä läpäisy- ja tiputteluvuotojen todennäköisyyttä.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia sairauksia on raportoitu useammin hormonikorvaushoitoa käyttävillä naisilla kuin sitä käyttämättömillä naisilla:

- rintasyöpä
- kohdun limakalvon kasvuun liittyvät poikkeavuudet (kohdun limakalvon liikakasvu tai syöpä)
- munasarjasyöpä
- laskimotukokset jaloissa tai keuhkoissa (laskimotromboembolia)
- sydäntauti
- aivohalvaus
- todennäköinen muistamattomuus, jos hormonikorvaushoito aloitetaan yli 65 vuoden iässä.

Lisätietoja näistä sivuvaikutuksista on pakkausselosteessa: Tietoja käyttäjälle Evorel Conti depotlaastarit (estradioli/noretisteroni)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen ja raportointi

Jos sinulla on haittavaikutuksia, kerro lääkärille/hoitajalle tai apteekin henkilökunnalle. Tämä koskee myös haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu näissä tiedoissa. Voit myös ilmoittaa suoraan Fimeaan: www.fimea.fi. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa lisäämään tietoa lääkkeen turvallisuudesta. Jos sinulla on tuotettamme Evorel Conti depotlaastarit koskevia lääketieteellisiä kysymyksiä, ota yhteyttä sähköpostilla: drugsafety@consilienthealth.com. Tuotetta Evorel Conti depotlaastarit koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä pohjoismaiseen konttoriimme: infonordic@consilienthealth.com

Tämä potilasinfo ei korvaa pakkausselostetta. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen ennen valmisteen käyttöä.